

CARDINALITIIS DISPUTATIONIBVS EXAGITANDA IN SCHOLIS

Medicorum, die Iouis, 9. Martij, D. Gulielmo de Baillou, Doctore Medico, moderatore prudentissimo.

An qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem fiunt, citò moriantur?

In corpore iusta temperies, actionum auctor, ita figura & syntaxis certè debet. Vtrumque & in toto, & in partibus. Hoc continuum est instar circuli, adeo omnium conspiratio. Adeo mirabilis videri debet existit. Temperies mixtionis contrariorum soboles (unde homini varietas grata & utilis) anima obscurave natura dicta neutriquam transformatur. Hac morum genitiuorum fons, in ea hominis iulæ, mæ, ætæ, unde cuique sui manes. Figura mira partium descriptione elucet, seu ipsa seu eide dicatur, temperiem vel materiem secuta. Tanti est figura, vt ab ea prognoses & therapia momenta eliciantur. Hinc qui morbus habitui congruit, minus periculosus. etsi alatis certò tabes prasagitur. Hinc inflexio spine intus vel foris nata creat periculum citò necans aut non, prout maturè vel serò acciderit. Et queis male conformata pars, maximè si thorax, citius & audaciùs phlebotomia consulendum.

PPRIME verò contentorum & continentium analogia confert. Cerebro magno caput augetur, paruo minuitur. Cum corde augetur pectus. Thorace angustò, si cor magnum, celeri ac crebro motu sanguinem rapiens suffocatur. Si pulmo adoleuerit, nec thorax obsequitur, calamitas. Hinc dyspnœa, quam angustia, à compressione, depressione, tuberculo, vasorum obstructio & conuientia ex marcore pulmonis parit. Si cranium cerebri incapax, aut coma, aut Epilepsia, luna plenior. Si caput acuminatum, motus & sensus oblesio. Magnitudinis integritas actionū sequax. Qui breui corpore, prudentior. Qui longo & tenui, fluxiones sentit tabis minaces. Gibbositas (vulgi opprobrium, vthominis natura procax est in alienis miserijs, ac si gibbum esset nequitia latebra) senectutis sæpè comes, cui longa statura parum est speciosa. Mala denique conformatio nocet, pessima thoracis.

THORAX offensus est, vt contentis maior securitas. Hoc prasidium, morborum Ilias oppugnat, expugnat sæpè. A capite inimica fluxio si alium turbat, thoraci parit. Vnde libet sit impetus in thoracem. Imò in thorace seditionis fomes, cum aut congeritur humor, aut tabifica vis à stirpe per traducem hausta, & ab alijs haurienda. Ad hanc facit motus, vt & in oculis. Et cum hinc inde humorum impetus, morborum idea sunt, vt pleuritidæ. Si ab inferioribus pleuritis, purgatio & phlebotomia conuenit. Quamquam hac morborum thoracis in quibus. Cacochymis ex opposito confert, si rigorem pleuritis secuta, quo & soluitur. In squalore, & summa hyeme pleuritis æstios. Hyeme, fortis satis est, in squalore potio multa. Preceps hic phlebotomia precipitatur: licet aucta febris & dolor, non ideo venam incides, si dies criticus, si coctio sit febris & doloris prouocatrix. Sudor pleuritidis sæpè solutio est. Coctio in morbis thoracis tanti est, vt si mutato morbo, nō vitato periculo ex pleuritico fiat empyicus, non sit tutum statim pus educere. Puris sit quadam pudore, quia loci mutatio sit. Expectandum donec denuo mature scat. Si peripneumonia abscessu in crura terminetur, coctio spūto, abest metus claudicationis, puto crudo non abfuturus. Nec minùs valet exacta diata, exactior tamen seruanda in partium naturalium, quàm pulmonis morbis.

NEC hic impetus humorum spine parit. hac varias habet partes, vt harum, ita periculi, affectuum, criseon varietas. hac natura in quibus, in quibus, leniter conuexa ac sinuosa. Natia amissa retentio, fuga periculi est. Kaxoxes aliàs funestum, aliàs non. Pueris, quòd corpus adolescat, propter phymata aut quid violentum, perniciēs. Partis spine deprauatio, alimenti & incrementi eius prohibitio est. Augetur pulmo, thorax incapax. Quo longius spine à principio abest, minor calamitas. Media spine, maior, ceruicis pessima. Anginosi necantur. Prout vel intro, vel extra, vel ad latus sit inflexio, variæ idea, existit. Crudum phyma dyspnœa, coctū tussis auctor est. licet Coctio vbiq; vt blada mater sit, hic nouera est, quia inde plus periculi, nī pus exeat. Retentum tabefacit, brachia maximè. Adiuuare potest mirus thoracis cum genitalibus consensus. Tumor testium periculi vindex est. Inferioris spine phyma benignius est, oborto varice, aut dysenteria curabile.

MISERE ergo in tussi & anhelitu moriundum. At prædictio mali probatur, si ad eam cautio adiungitur. Nec enim atatura misera miseriori prognosi relinquenda. Ac si vix natus homunculus ob eminum in spine tuber, tanquam tumulum, vni tumulo reseruetur. Cyphosis omnis mala (licet quadam à phrenitide liberari) pessima crescente corpore, aut anteuerenda aut curanda. Iuuat decubitus, cuius figura facile inflectunt. Si à capite malum, cauteria occipiti: sin minus, dorso adhibentor. Frictiones, metasyneitica, vnguentum auxiliare, siccans diata: scyna cum herbis vulnerarijs: purgatio frequens: anacatharsis. catharsis licet atatura mala, cyphosi melior est. artificiofa fasciarum administratio. detractio sanguinis frequens. Quippe distorsiones spine largus sanguinis fluxus soluit. hac & similia ars, vt sedulu: promus condus prodet, vt non tam calamitosa, vera tamen, prognosi, quam salubri therapia commendandus Hippocrates melior medicus quam augur pronuntiari,

Qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem fiunt, citò moriuntur.

Asserebat IACOBVS LESCRIVAIN Andinus. CIO. IO. XCV.

